



# Drakar

## Potas dolistny

### Opis

Drakar jest skoncentrowanym płynnym produktem do odżywiania roślin, powstałym na bazie potasu (K) i całkowicie rozpuszczalnym w wodzie. Zapobiega i likwiduje niedobór potasu

### Korzyści

Potas (K) wpływa na :

- Zbiór: poprzez przyspieszenie wzrostu i wielkości .
- Jakość:
  - poprzez wyższe stężenie cukru (°Brix)
  - poprzez lepsze ubarwienie (antocyjany i karoteny)
  - poprzez lepszą jakość skórki (ściany komórkowe)
  - poprzez lepszą koncentrację cukru (skrobi).

Drakar jest produktem opracowanym w celu uniknięcia konfliktu z jonami Ca<sup>++</sup> i Mg<sup>++</sup> obecnymi w twardej wodzie, które znacznie zmniejszają skuteczność nawozów potasowych.

Drakar jest całkowicie bezpieczny w użyciu ponieważ nie zawiera chloru, siarki, tlenku azotu i tlenku amonu.

### Skład

Potas (K <sub>2</sub> O)	462 g/l	(31 % p/p)
Azot łącznie (N) w formie moczanu	45 g/l	(3 % p/p)

### Właściwości fizykochemiczne

- Postać : płynna
- Kolor : bezbarwny
- Gęstość : 1.5
- pH : 12.5

- NAWÓZ WE

Manufactured by: Tradecorp

Parque Empresarial Cristalia,  
C. Vía de los Poblados, 3, Edificio  
5, 28033 Madrid

info.poland@rovensanext.com  
www.rovensanext.pl

**Let's grow greener**

 **Rovensa  
Next**

CE

### Zalecenia

<b>Aplikacja Doglebowa</b>		
Wszystkie uprawy	50 l/ha	Przed wysadzeniem, siewem
<b>Aplikacja Dolistna</b>		
Burak	2 x 3 L/ha	pierwszy zabieg w fazie 6-go liścia a następny po ok. 10 dniach (do czasu zwarcia rzędów).
Zboża	2 x 2 L/ha	Przed kwitnieniem i po kwitnieniu
Ziemniak	2-3 x 3 L/ha	pierwszy zabieg w momencie tworzenia stolonów oraz drugi w momencie zawiązywania bulw.
Rzepak	2 x 3 L/ha	po kwitnieniu na początku wiązaniem łuszczyn oraz ok.10 dni później.
Jabłonie – Grusze – Brzoskwinie – Morele	5 x 2-3 L/ha	w okresie od wiązania owoców, przez cały czas przyrastania. Ostatni zabieg do 4 dni przed zbiorem.
Śliwy, wiśnie i czereśnie	3 x 3 L/ha	w okresie od wiązania owoców, przez cały czas przyrastania. Ostatni zabieg do 4 dni przed zbiorem.
Truskawka	3-4 x 2 L/ha	w okresie wzrostu owoców.
Cebula	2 x 3 L/ha	od momentu intensywnego tworzenia cebul, drugi zabieg po ok. 10 dniach.
Marchew	3 L/ha 3 L/ha	po ok. 100 dniach od wschodów, oraz na ok. 4 tygodnie przed zbiorem.
Kapusta głowiasta – Pekińska	2 x 4 L/ha	początek wiązania główek, drugi oprysk po ok. 10 dniach.
Kalafior – Brokuł	2 x 4 L/ha	początek tworzenia róż, drugi oprysk po ok. 6 dniach.
Ogórek	3-4 x 2 L/ha	od fazy zawiązywania owoców, co 4-6 dni oprysk.
Pomidor – Papryka	2 L/ha 2 L/ha 2 L/ha	po zawiązaniu owoców, w trakcie dorastania owoców, oraz na wybarwienie owoców (ok. 7-10 dni przed zbiorem).

*Nie robić aplikacji dolistnej przy intensywnym nasłonecznieniu, wysokiej temperaturze powietrza (> 27 st.C), suchym wietrze, itp. Zabieg robić na koniec dnia gdyż będzie skuteczniejszy i bezpieczniejszy. Drakar K stosować dolistnie w postaci oprysku cieczą roboczą w ilości min 150-200 L/ha.*

#### Kompatybilność

Nawóz można łączyć z większością innych nawozów dolistnych. W przypadku łącznego stosowania z innymi produktami zaleca się wykonanie próby mieszania w niewielkim pojemniku zachowując proporcje produktów i wody w przeliczeniu na hektar. Nie zaleca się mieszania więcej niż dwóch produktów.

Najlepszy efekt oprysku uzyskuje się po wykonaniu zabiegu na suche liście. Oprysk wykonać nie później niż 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem.

